

浦东新区拔罐疗法收费明细

生成日期：2025-10-23

在拔罐时，轻微的瘙痒属于拔罐后的正常反应，不需要过多处理。剧烈瘙痒时，需暂停拔罐去医院皮肤科就诊，在医生指导下外涂糠酸莫米松乳膏、丁酸氢化可的松乳膏等药膏来止痒。拔罐的局部异常反应：上罐后，患者感到局部非常紧张、疼痛、灼辣难忍，数分钟即起水疱；或于施术局部的远端感觉发凉、发麻、疼痛等。引起原因：患者紧张；罐具型号选择不当，吸力过大；操作失误，明火未灭，或温度过高，灼伤皮肤，或皮肤原来就有伤口；所涂药物刺激过强；罐口边缘过薄或不光滑，或者皮肤干枯松弛，上罐操作时旋转了手腕使皮肤出现皱褶；吸罐时间过长，局部瘀血过多，隆起明显；局部有浅表的较大动脉分布，由于吸力作用，动脉受压，影响血运，使远端组织出血或缺血。拔罐中的留罐时间一般留置5-15分钟。浦东新区拔罐疗法收费明细

如何预防拔罐出现水泡？1、在使用多罐时，火罐排列的距离一般不宜太近，否则因皮肤被火罐牵拉会产生疼痛，同时因罐子互相排挤，也不宜拔牢。2、根据不同部位，选用大小合适的罐。应用投火法拔罐时，火焰须旺，动作要快，使罐口向上倾斜，避免火源掉下烫伤皮肤。应用闪火法时，棉花棒蘸酒精不要太多，以防酒精滴下烧、伤皮肤。用贴棉法时，须防止燃着棉花脱下。用架火法时，扣罩要准确，不要把燃着的火架撞翻。用煮水罐时，应用去罐中的热水，以免烫伤病人的皮肤。3、拔罐后如有出血，可用干棉球拭去。一般局部呈现红晕或紫绀色（淤血），为正常现象，会自行消退。如局部瘀血严重者，不宜在原位再拔。如留罐时间过长，皮肤会起水泡，小的不需处理，防止擦破引起沾染；大的可以用针刺破，流出泡内液体，涂以龙胆紫药水，覆盖消毒敷料，防止传染。浦东新区拔罐疗法收费明细在拔罐中，罐大吸拔力强的应适当减少留罐时间。

拔罐中的单罐用于病变范围较小或压痛点，可按病变的或压痛的范围大小，选用适当口径的火罐。多罐用于病变范围比较普遍的疾病。可按病变部位的解剖形态等情况，酌量吸拔数个乃至拾数个。如某一肌束劳损时可按肌束的位置成行排列吸拔多个火罐，称为“排罐法”。疗养某些内脏或组织的淤血时，可按脏器的解剖部位的范围在相应的体表部位纵横并列吸拔几个罐子。闪罐主要是将罐子拔上后，立即起下，反复吸拔多次，至皮肤潮红为止。留罐是，拔罐后，留置一定的时间，一般留置5-15分钟。罐大吸拔力强的应适当减少留罐时间，夏季及肌肤薄处，留罐时间也不宜过长，以免损伤皮肤。

无论是陶罐、玻璃罐还是竹罐，都是利用负压原理进行治疗。拔罐产生的负压效应值可达380mmHg较强的吸拔力能直接影响组织液的流动，致使皮下及浅层肌充血，进而刺激皮肤与经络穴位，促进经络气血运行，从而将深层次的病理物质吸到浅层，以达到散邪解表、疏通经络的功效。拔罐既能治病，又可作为预防保健措施，这一点毋庸置疑。但需要强调的是，拔罐并不是治百病的，治理必须因人而异，辨证施法。拔罐的适应证主要有：颈椎病、肩周炎、网球肘、面神经麻痹、神经衰弱、落枕、急性腰损坐骨神经痛、支气管、膈肌痉挛、急性扁桃体炎、慢性胃炎、更年期综合症、妇科疾病等。拔罐中的走罐又称推罐，一般用于面积较大、肌肉厚的部位，如腰背部、大腿部等。

拔罐出水泡怎么回事？1、患者体内风寒湿毒较盛，以湿气为突出。起泡也是一种邪气外出的表现，有时会在罐壁上出现小水滴，也是湿邪的表现。2、留罐时间长。这一点因人而异，也是和体质有关系的。有人留罐20-30分钟也不会有起泡的现象，也有人5-10分钟就会起泡，所以一般初次拔罐时间需要短一些，等对患者情况了解了，就可以适当放宽时间。3、罐子温度较高。这一点只有很小的可能性。有时做闪罐，如果造成罐体温度过高，这时留罐的话，会增加起泡的可能。拔罐法具有通经活络、消肿止痛、去风散寒等作用。浦东新区拔

罐疗法收费明细

拔罐前，要检查拔罐的部位和患者位置，是否合适。浦东新区拔罐疗法收费明细

拔罐后小孔如有出血，可用干棉球拭去。一般局部呈现红晕或紫绀色（淤血），为正常现象，会自行消退。如局部瘀血严重者，不宜在原位再拔。如留罐时间过长，皮肤会起水泡，小的不需处理，防止擦破引起影响；大的可以用针刺破，流出泡内液体，涂以龙胆紫药水，覆盖消毒敷料，防止影响。造成火罐烫伤的主要原因是酒精用的过多，滴在罐内皮肤，烫起一片血泡；火焰烧热罐口，容易叫罐口烙伤圆圈。留罐时间过长，容易拔起白水泡。在拔罐地方，事前先涂些水（冬季涂温水）。涂水可使局部降温，保护皮肤，不致烫伤；酒精棉球火焰，一定要朝向罐底，万不可烧着罐口，罐口也不要沾上酒精。浦东新区拔罐疗法收费明细